ETIQUETTE CANADIENNE

GROUPE 10 ACARICIDE

Apollo® SC OVICIDE/MITICIDE

aussi un effet contre les jeunes insectes qui commen-cent à se déplacer. La durée de son activité résiduelle Une préparation à suspension concentrée (SC) pour la suppression d'acariens sur les pommes, les poires, les pêches, les nectarines, les framboises, et les fraises

GARANTIE

Clofentezine* ..... 500 grammes par litre
*3,6-bis(2-chlorophényl) -1,2,4,5-tétrazine

NO D'HOMOLOGATION. 21035 **LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

CAUTION POISON

TRIPLE

RINSE

LIRE L'ETIQUETTE AVANT D'UTILISER

GARDER HORS DE PORTEE D'ENFANTS

MANA

Makhteshim Agan of North America, Inc.
551 Fifth Avenue/Suite 1100
New York, NY 10176
1-212-661-9800

Etiquette de spécimen

PRECAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS: Ne pas ingérer. Éviter son contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Tous les utilisateurs doivent se conformer aux précautions de manutention, au mode d'emploi et aux méthodes de nettoyage qui apparaissent sur l'étiquette. Porter un chapeau à large rebord, un couvre-tout à manches longues et un tablier (ou un costume de pluie non perméable) et des gants appropriés à l'épreuve des produits chimiques durant le malaxage, le chargement, l'application et le nettoyage, afin de minimiser l'exposition au produit. Bien se laver les mains et la peau exposée avant de manger, boire ou fumer et après avoir pulvérisé ou manipulé le produit. Bien laver tous les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Pour protéger les poissonset la faune, ne jamais contaminer les lacs, les riv-ières, les cours d'eau et les étangs avec l'Apollo SC.

En début de saison, on obtiendra les meilleurs Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org/

PREMIERS SOINS

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

INTERNES: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Rincer la bouche à fond et donner de l'eau à boire. Recourir immédiatement à des soins médicaux, ou contacter un centre antipoison.

EXTERNES: En cas de contact avec la peau ou les yeux rincer immédiatement à grande eau. Recourir à des soins médicaux si l'irritation persiste, ou contacter un centre antipoison.

INHALATION: En cas d'inhalation, éloigner le patient du lieu d'exposition.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le contact du pro-duit avec la peau ou les yeux peut causer une irritation. Le personnel médical doit communiquer avec le services d'information médicales attaquent les tétranyques. Makhteshim Agan of North America, Inc. 212-661-9800.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Entreposage: Conserver dans son contenant d'origine, hermétiquement fermé, dans un endroit sûr.

Élimination des contenats recyclables: Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un con-tenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son dis-tributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'ad-ministration municipale pour savoir où se trouve lepoint de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pres-sion. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable. S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le con-tenant conformément à la réglementation provinciale.

Élimination des produits non utilisés ou don't on veut se départir: Pour tout renseignement con-cernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'or-ganisme de réglementation provincial. S'adresser égale-ment à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Pour plus d'information ou en cas d'incendie, de fuite ou d'endommagement de recipeients, signaler immediatemwnt: 1-800-334-7577.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette, de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette. condition.

MODE D'EMPLOI

Renseignements généraux: L'Apollo SC est un acaricide ou miticide spécifique qui exerce son action surtout comme ovicide mais qui a aussi un effet contre les jeunes insectes qui commencent à se déplacer. La durée de son activité résiduelle pêches, les nectarines, les framboises, et les fraises contre les tétranyques visés particulièrement lorsqu'il est appliqué entre la dormance retardée et la première couverture, dépend de l'âge des groupes de tétranyques traîtés, des espèces de tétranyques et des populations de prédateurs qui attaquent les tétranyques.

Attention: Les cultures ou endroits traitez ne doivent pas être utilisés pour le pâturage ou comme fourrage; il n'y a pas assez de données disponibles à ce moment pour appuyer un tel usage.

Ne pas faire Plus d'une application d'Apollo SC par saison.

Emploi sur les pommiers et poires
Espèces visées:
Tétranyque rouge du pommier *Panonychus ulmi*
Tétranyque à deux points *Tetranychus urticae*
Tétranyque de McDaniel *Tetranychus mcdanieli*

Appliquer à l'aide d'un équipement terrestre en utilisant des arrosages dilués ou concentrés. Appliquer de 300 à 600 mL d'Apollo SC par hectare. Lorsqu'on emploie un taux élevé de dilution (3800 litres d'eau ou plus), il faut utiliser au moins 75 mL d'Apollo SC par 950 litres de bouillie de pulvérisation. Utiliser suffisamment d'eau pour couvrir complètement les arbres, mais jamais moins de 475 litres par hectare. Ne pas utiliser moins de 300 mL d'Apollo SC par hectare dans les arrosages concentrés. L'Apollo donne de meilleurs résultats lorsqu'on l'applique sur les oeufs ou sur les jeunes insectes qui commencent à se déplacer, mais il n'est pas efficace contre les adultes.

Pommiers
L'Apollo SC peut être appliqué n'importe quand à par-tir de la dormance retardée jusqu'à la première couverture. En début de saison, on obtiendra les meilleurs resultants possibles si les traîtements sont effectués au moment de la chute des pétales, avant l'éclosion des tétranyques.

Ne pas appliquer après la première couverture (pourvu que la première couverture ne soit pas plus de 14 jours après la chute des pétales).

Poires
Apollo SC peut être appliqué du début de la saison (après la dormance retardée) jusqu'a l'été. Appliquer dès les premiers signes de la présence d'acariens, lorsque les populations sont surtout composées d'oeufs et de quelques jeunes insectes qui se déplacent (moins de 3 par feuille). Ne pas appliquer dans les 21 jours centre antipoison. précédant la récolte.

NOTA:
Voici des facteurs qui pourraient inciter les utilisateurs à employer une dose supérieure à 300 mL d'Apollo SC par hectare:
1. Applications plus tôt en saison pour les sections où il y a beaucoup d'oeufs de tétranyques rouges du pom-mier quiont survécu à l'hiver.
2. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs qui attaquent les tétranyques.
3. Pour assurer un bon recouvrement d'arbres réguliers arrivés à leur pleine grandeur et/ou d'arbres qui sont très feuillus.

Emploi sur les pêches et les nectarines

Espèces visées:
Tétranyque à deux points .....*Tetranychus urticae*
Tétranyque rouge, du pommier .....*Panonychus ulmi*

Pulvériser à l'aide d'équipement terrestre à air com-primé. Appliquer à raison de 300 mL d'Apollo SC par hectare. Utiliser un volume d'eau suffisant pour obtenir une application uniforme mais pas moins de 475 litres par hectare. ApolloSC peut être appliqué au début de la saison (stade de fin de dormance) et jusqu'à 14 jours après le stade du calice. Appliquer dès les premiers signes de présence des acariens, lorsque les populations présentes sont surtout au stade des oeufs et qu'on note peu de jeunes insects mobiles. Ne pas appliquer dans les 21 jours précédant la récolte.

Emploi sur les framboises et les fraises

Espèce visée:
Tétranyque à deux points ..... *Tetranychus urticae*

Appliquer au taux de 500 mL/ha aux premiers signes d'activité des acariens. Appliquer à l'aide d'un équipement terrestre en utilisant 500 à 1000 litres d'eau par hectare. Ne pas appliquer dans les 15 jours précédant la récolte.

GESTION DE LA RÉSISTANCE DES ACARIENS

La surutilisation, l'utilisation inapproprié et/ou l'emploi répété d'acaricides affichant un mode d'action similaire peut se traduire par l'apparition de souches d'acariens résistantes. Pour suivre de bonnes pratiques de gestion de la résistance, Makhteshim Agan of North America recommande qu'Apollo SC ne soit appliqué qu'une fois par produits antiparasitaires. année. Si d'autres traitements acaricides s'imposent aucours d'une saison, utiliser un acaricide qui affiche un mode d'action différent. Communiquer avec les spécialistes agricoles de la région pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation d'Apollo SC dans le cadre d'une stratégie globale de lutte antiparasitaire.